


Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie w sezonie 2021/2022

Sytuacja w Polsce

Województwo	Powiat	Liczba ognisk u drobiu w sezonie	Liczba ognisk u drobiu w 2022 r.	Liczba ognisk u dzikich ptaków	Liczba dodatkich dzikich ptaków w ognisku/ach
dolnośląskie	milicki	1	-	-	-
	średzki	1	-	-	-
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	1	-	-	-
	świecki	1	1	3	3
	tucholski	1	1	-	-
	włocławski	-	-	1	1
lubelskie	białski	1	1	-	-
	lubartowski	1	1	-	-
lubuskie	międzyrzecki	2	-	-	-
łódzkie	łęczycki	-	-	1	1
	łódzki	-	-	1	1
	piotrkowski	1	-	-	-
	poddębicki	5	-	-	-
	sieradzki	4	1	-	-
	wieruszowski	1	-	-	-
	zgierski	1	-	1	1
mazowieckie	łosicki	2	2	-	-
	siedlecki	7	-	2	2
	sokołowski	1	-	-	-
pomorskie	nowodworski	-	-	2	2
śląskie	bielski	1	-	-	-
	tarnogórski	2	-	-	-
	zawierciański	1	-	-	-
świętokrzyskie	konecki	-	-	1	1
warmińsko-mazurskie	iławski	5	-	-	-
wielkopolskie	gostyński	1	-	-	-
	kaliski	11	-	-	-
	kępiński	1	-	-	-
	kolski	2	-	1	3
	ostrowski	3	1	-	-
	ostrzeszowski	6	2	-	-
	turecki	9	-	1	1
	wolsztyński	1	-	-	-
zachodniopomorskie	koszaliński	-	-	3	8
Razem		74	10	17	24



Ogniska HPAI


- drób fermowy H5N1
- drób przyzagrodowy H5N1
- ★ dzikie ptaki H5N1

Sytuacja w Europie

na podstawie informacji uzyskanej z EURL ds. grypy ptaków w Padwie

Kraj (kolejność alfabetyczna)	Liczba ognisk u drobiu	Liczba ognisk u ptaków dzikich utrzymywanych w zamknięciu	Liczba ognisk u dzikich ptaków
Austria	1	1	11
Belgia	3	1	19
Bośnia i Hercegowina	-	-	1
Bułgaria	5	2	1
Chorwacja	-	-	9
Czechy	5	7	7
Dania	7	1	47
Estonia	-	2	8
Finlandia	-	-	7
Francja	63	-	20
Grecja	-	-	1
Hiszpania	-	-	1
Irlandia	6	-	32
Irlandia Północna*	4	1	6
Luksemburg	-	-	4
Niderlandy	20	-	141
Niemcy	51	1	380
Norwegia	2	-	4
Polska	74	-	17
Portugalia	4	-	1
Rumunia	-	-	4
Słowacja	-	3	6
Słowenia	-	1	18
Szwajcaria	1	-	-
Szwecja	5	-	23
Ukraina	2	-	-
Węgry	101	5	10
Włochy	299	7	16
Razem	653	32	794

* w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, tabela uwzględnia tylko Irlandię Północną; brak danych dla Anglii, Szkocji i Walii



Podsumowanie

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie występowania zakażeń wirusami HPAI rozwija się w sezonie 2021/2022 bardzo niekorzystnie, zarówno w Polsce, jak też całej Europie. Ekspersi z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków PIWet-PIB w Puławach zalecają utrzymywanie stanu gotowości, w tym:

- prowadzenie ciągłej kampanii informacyjnej wśród hodowców,
- wzmocnienie bioasekuracji,
- zintensyfikowanie monitoringu biernego u dzikich ptaków (skoncentrowanego na grupach ryzyka –głównie gęsi, łabędzie, kaczki, ptaki drapieżne) oraz
- badanie próbek od drobiu, wykazującego objawy nasuwające podejrzenie HPAI, tzn.
 - zwiększona śmiertelność;
 - znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 - objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów;
 - duszność;
 - sinica i wybroczyny;
 - biegunka;
 - spadek nieśności (w początkowym okresie choroby nie zawsze obserwowany)

Opracowanie: dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu, prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk