

Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie w sezonie 2022/2023

Wstęp

W sezonie 2021/2022 (tzn. od października 2021 do początku września 2022 r.) odnotowano w Polsce 98 ognisk HPAI u drobiu. Liczba ognisk u dzikich ptaków w całym sezonie wyniosła 36.

Od połowy września b.r., zgodnie z przyjętą koncepcją sezonowości występowania zakażeń wirusami HPAI, Laboratorium Referencyjne UE ds. grypy ptaków w Padwie prowadzi nowy rejestr ognisk HPAI w Europie w sezonie 2022/2023. W odniesieniu do sytuacji w Polsce, przedstawiony w poniższej tabeli rejestr ognisk HPAI w sezonie 2022/2023 jest uzupełniony o rubryki dotyczące liczby ognisk w roku kalendarzowym 2022:


Sytuacja w Polsce

Województwo	Powiat	Liczba ognisk u drobiu w 2022 r.	Liczba ognisk u drobiu w sezonie 2022/2023	Liczba ognisk u dzikich ptaków w 2022 r.	Liczba ognisk u dzikich ptaków w sezonie 2022/2023
dolnośląskie	milicki	1	-	-	-
	wołowski	-	-	1	-
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	1	-	1	-
	sępoleński	1	-	1	-
	świecki	1	-	1	-
	tucholski	1	-	-	-
	włocławski	-	-	1	-
lubelskie	białski	1	-	-	-
	lubartowski	1	-	-	-
łódzkie	łęczycki	2	1	-	-
	m. Łódź	-	-	1	-
	poddębicki	2	-	-	-
	sieradzki	2	-	-	-
małopolskie	krakowski	1	-	-	-
mazowieckie	legionowski	-	-	2	-
	łosicki	2	-	-	-
	nowodworski	-	-	1	-
	m. stołeczne Warszawa	-	-	1	-
opolskie	głubczycki	1	-	-	-
	namysłowski	-	-	1	-
podkarpackie	przeworski	1	-	-	-
pomorskie	człuchowski	1	-	1	-
	Gdańsk	-	-	2	-
	nowodworski	-	-	2	-
	pucki	-	-	3	-
	słupski	-	-	1	-
	pszczyński	-	-	2	-

świętokrzyskie	konecki	-	-	2	-
	olsztyński	-	-	1	-
	kaliski	2	-	-	-
	kościański	1	-	-	-
	ostrowski	3	-	-	-
	ostrzeszowski	5	-	-	-
	poznański	1	-	-	-
	wolsztyński	4	-	-	-
zachodniopomorskie	koszaliński	-	-	3	-
Razem		35	1	28	0

Z wyjątkiem jednego ogniska w powiecie głubczyckim, gdzie stwierdzono obecność wirusa grypy podtypu H5N2, wszystkie pozostałe krajowe szczepy wirusa wykryte w 2022 roku należą do podtypu H5N1.

Ryc. 1 Lokalizacja ognisk HPAI w Polsce w sezonie 2022/2023




Sytuacja w Europie w sezonie 2022/2023

na podstawie informacji uzyskanej z EURL ds. grypy ptaków w Padwie

	Państwo	Liczba ognisk u drobiu	Liczba ognisk u ptaków utrzymywanych w zamknięciu (nie spełniających kryteriów definicji „drobiu”)	Liczba ognisk u dzikich ptaków	Ogółem
1	Holandia	18	10	84	112
2	Francja	38	39	19	96
3	Niemcy	32	7	54	93
4	Belgia	7	9	42	58
5	Hiszpania	1	0	54	55
6	Włochy	17	0	15	32
7	Islandia	0	0	11	11
8	Dania	1	1	7	9
9	Węgry	8	0	0	8
10	Norwegia	1	0	6	7
11	Irlandia Pn.	0	1	5	6
12	Irlandia	0	2	3	5
13	Portugalia	1	0	2	3
14	Szwecja	0	0	2	2
15	Finlandia	0	1	0	1
16	Słowenia	0	1	0	1
17	Polska	1	0	0	1
18	Chorwacja	0	0	1	1
19	Bułgaria	0	1	0	1
20	Austria	0	1	0	1
	Razem	125	73	308	505

* w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, tabela uwzględnia tylko Irlandię Północną; brak danych dla Anglii, Szkocji i Walii

Ryc. 2 Lokalizacja ognisk HPAI w Europie w sezonie 2022/2023



Podsumowanie

W ciągu kilku ostatnich tygodni liczba ognisk HPAI sukcesywnie wzrasta, choć nie jest to wzrost dynamiczny. Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. grypy ptaków PIWet-PIB w Puławach rekomenduje konieczność utrzymywania stanu wzmożonej gotowości, w tym badania próbek od drobiu wykazującego objawy nasuwające podejrzenie HPAI, takich jak:

- zwiększona śmiertelność;
- znaczący spadek pobierania paszy i wody;
- objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
- duszność;
- sinica i wybroczyny;
- biegunka;
- spadek nieśności (w początkowym okresie choroby nie zawsze obserwowany)

Wskazane jest również zintensyfikowanie monitoringu biernego u dzikich ptaków.

UWAGA: Z napływających z niektórych państw informacji wynika, że wirus w nowym sezonie może wykazywać zwiększoną, w porównaniu z poprzednimi latami, zjadliwość dla drobiu wodnego.

Opracowanie: dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu, prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk